

## Encyclopédie méthodique: ou par ordre de matières, Volume 121

Hélix naticoides Drap Moll pi 1 1 Jig 1 7 a 20 Fercs Hist des Moll n 1 5 pi 1 1 Jig 17121 Lamk Anim s vert tom 6 pag 69 n 13 Coquille globuleuse dont le dernier tout est très grand et la spire courte et obtuse elle est formée de trois à quatre tours convexes ils sont ridés on striés irrégulièrement dans leur longueur et leur suture simple est peu profonde En dessous la coquille est très convexe sans ombilic et terminée par une ouverture très grande arrondie ou subovale très évasée à la base un peu plus haute que large Le péristome très mince et tranchant est garni en dedans dans toute son étendue d'un bourrelet plat blanc de lait Ce péristome se continue avec la culumelle celle-ci est réduite à un filet spiral extrêmement mince et tranchant Le bord gauche ne se montre que dans les vieux individus il consiste en une lame blanche très mince appliquée dans toute l'étendue de l'avant dernier tour qui sépare les deux parties du péristome Cette coquille est peu variable pour la couleur qui est partout d'une teinte uniforme soit brun verdâtre ou jaunâtre soit vert teinté de jaune d'ambre L'épiphragme est remarquable en ce qu'il est fortement bombé et toujours appliqué sur la partie la plus externe du bourrelet du péristome à gauche il dépasse le bord de l'ouverture et se pose sur le contour du bord gauche Cette espèce se trouve en France à Algérie Corse en Sicile etc